

Mi Guía de conversación con el médico

Recuerde que su médico está para ayudarle a encontrar las respuestas que busca. Si no entiende lo que su médico le está diciendo, no tema pedirle que le explique un poco más. Considere también preguntarle a su médico si usted puede grabar la conversación para usarla más tarde como referencia.

Mi camino con la esclerosis múltiple

¿Cómo puedo mantener mejor mi habilidad física y mis capacidades?

Además, cómo puedo continuar con mi(s):

- ☐ Pasatiempos
- ☐ Trabajo
- ☐ Cuidado de los niños
- ☐ Planificación familiar
- ☐ Actividades sociales

Entendiendo los tratamientos para la EM

Qué tipos de tratamientos para la EM están disponibles y cuáles:

- ☐ Reducen las recaídas
- ☐ Retrasan la progresión de la discapacidad
- ☐ Disminuyen el desarrollo de lesiones



Mis síntomas

Estoy experimentando estos síntomas:

- ☐ Fatiga
- ☐ Pérdida del sentido del gusto
- ☐ Dificultad al caminar
- ☐ Vértigo o mareos
- ☐ Hormigueo o entumecimiento
- ☐ Problemas vesicales
- ☐ Espasmos, temblores o convulsiones
- ☐ Problemas sexuales
- ☐ Disminución de la fuerza
- ☐ Problemas intestinales
- ☐ Problemas del habla
- ☐ Dolor y picazón
- ☐ Problemas visuales
- ☐ Problemas cognitivos
- ☐ Pérdida de la audición
- ☐ Cambios emocionales
- ☐ Problemas respiratorios
- ☐ Depresión

Sobre los tratamientos con OCREVUS

- ☐ ¿Son OCREVUS ZUNOVO® (ocrelizumab e hialuronidasa-ocsq) u OCREVUS® (ocrelizumab) buenas opciones para mí? ¿Por qué?
- ☐ ¿En qué se diferencian las infusiones de las inyecciones?
- ☐ ¿Qué debo saber sobre seguridad y efectos secundarios?
- ☐ ¿Cuál es la eficacia de los tratamientos de OCREVUS con respecto a las recaídas, progresión de la discapacidad y lesiones?
- ☐ ¿Cómo y dónde puedo programar mis tratamientos?

Use esta tabla para tomar notas cuando hable de los tratamientos para la EM con su médico.

TIPO DE TRATAMIENTO	 OCREVUS ZUNOVO	 OCREVUS	NOTAS
Método de administración	Inyección subcutánea	Infusión	
Tiempo de administración y frecuencia del tratamiento	~10 minutos*, 2 veces al año	4 horas* o 2 horas*†, 2 veces al año‡	
Formas de la EM que OCREVUS trata	Formas recidivante o primaria progresiva	Formas recidivante o primaria progresiva	

*Este es solo el tiempo de la administración y no incluye la duración total del tratamiento. La duración real en la clínica puede variar.

†Para los pacientes que reúnan los requisitos que no hayan experimentado previamente ninguna reacción grave a la infusión de OCREVUS.

‡La primera dosis se dividirá en 2 tratamientos, para un total de 3 tratamientos en su primer año.

Consulte la página 3 para ver la Información e indicaciones importantes de seguridad.

OCREVUS ZUNOVO®
ocrelizumab e hialuronidasa-ocsq
Inyección subcutánea de 920 mg/23,000 uds.



OCREVUS®
ocrelizumab
Inyección intravenosa de 100 mg/100 mL



Visite [OCREVUS.com/es](https://www.ocrevus.com/es) o haga clic para obtener la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de OCREVUS ZUNOVO, así como la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de OCREVUS.



Mis medicamentos actuales

Haga una lista de los medicamentos que está recibiendo actualmente, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios.



Preguntas adicionales y notas

Escriba cualquier otra pregunta que pueda tener o use este espacio para tomar notas durante su cita.

Consulte la página 3 para ver la Información e indicaciones importantes de seguridad.



Conozca más sobre la EM en nuestros eventos presenciales o en línea.

Escanee este código para registrarse



OCREVUS ZUNOVO™
ocrelizumab e hialuronidasa-ocsq
Inyección subcutánea de 920 mg/23,000 uds.



OCREVUS®
ocrelizumab INYECCIÓN
SUBCUTÁNEA
DE 920 MG/23,000 UDS.

Visite [OCREVUS.com/es](https://www.ocrevus.com/es) o haga clic para obtener la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de OCREVUS ZUNOVO, así como la [Información de prescripción](#) y la [Guía del medicamento](#) de OCREVUS.

© 2025 Genentech USA, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990. Todos los derechos reservados. M-US-00011146(v6.0) 10/25

Información importante de seguridad

¿Qué son OCREVUS y OCREVUS ZUNOVO?

OCREVUS y OCREVUS ZUNOVO son medicamentos de venta con receta empleados para tratar:

- Formas recidivantes de la esclerosis múltiple (EM), con la inclusión del síndrome clínico aislado, la enfermedad recidivante-remitente y la enfermedad secundaria progresiva activa en adultos.
- EM primaria progresiva en adultos.

No se sabe si OCREVUS y OCREVUS ZUNOVO son seguros y eficaces en niños.

¿Quiénes no deben recibir OCREVUS u OCREVUS ZUNOVO?

No reciba OCREVUS u OCREVUS ZUNOVO si:

- tiene una infección activa por el virus de la hepatitis B (VHB).
- ha tenido una reacción potencialmente mortal a la administración de ocrelizumab.
- ha tenido una reacción alérgica potencialmente mortal a ocrelizumab, hialuronidasa o a cualquiera de los ingredientes de OCREVUS ZUNOVO. Informe a su proveedor de atención médica si ha tenido anteriormente una reacción alérgica a OCREVUS u OCREVUS ZUNOVO o a cualquiera de sus ingredientes.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer acerca de OCREVUS y OCREVUS ZUNOVO?

OCREVUS y OCREVUS ZUNOVO pueden ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:

- **Reacciones a la infusión (OCREVUS):** las reacciones a la infusión son un efecto secundario frecuente de OCREVUS que pueden ser graves y requerir hospitalización. Permanecerá bajo observación mientras le administran la infusión y durante, al menos, 1 hora después de cada infusión de OCREVUS para detectar signos y síntomas de una reacción a la infusión.
- **Reacciones a la inyección (OCREVUS ZUNOVO):** las reacciones a la inyección son un efecto secundario frecuente de OCREVUS ZUNOVO que pueden ser graves y requerir hospitalización. Permanecerá bajo observación mientras le administran OCREVUS ZUNOVO para detectar signos y síntomas de una reacción a la inyección. Esto ocurrirá con todas las inyecciones durante, al menos, 1 hora después de la primera inyección y durante, al menos, 15 minutos después de todas las inyecciones posteriores a la primera inyección.
- **Infección:**
 - Las infecciones son un efecto secundario frecuente. OCREVUS y OCREVUS ZUNOVO aumentan el riesgo de presentar infecciones de las vías respiratorias superiores, infecciones de las vías respiratorias inferiores, infecciones cutáneas e infecciones herpéticas. Con OCREVUS y OCREVUS ZUNOVO pueden ocurrir infecciones graves que pueden poner en peligro la vida o causar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta una infección o cualquier signo de infección. Su proveedor de atención médica debe posponer el tratamiento con OCREVUS u OCREVUS ZUNOVO hasta que la infección se cure.
- **Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP):** la LMP es una infección encefálica poco frecuente que suele provocar la muerte o una discapacidad grave y se ha reportado al administrar ocrelizumab. Los síntomas de la LMP empeoran en cuestión de días a semanas.
- **Reducción en los niveles de inmunoglobulinas:** OCREVUS y OCREVUS ZUNOVO pueden ocasionar la disminución de algunos tipos de anticuerpos. Su proveedor de atención médica le hará algunos análisis de sangre para controlar sus niveles de inmunoglobulinas en la sangre.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de OCREVUS y OCREVUS ZUNOVO?

OCREVUS y OCREVUS ZUNOVO pueden ocasionar efectos secundarios graves, entre los que se incluyen:

- **Riesgo de cánceres (neoplasias malignas), incluido el cáncer de mama.** Siga las instrucciones de su proveedor de atención médica con respecto a las pautas habituales para la detección del cáncer de mama.
- **Inflamación del colon o colitis:** informe a su proveedor de atención médica si tiene algún signo de colitis como diarrea, sangre en la materia fecal y dolor de estómago.
- **Daño hepático.** OCREVUS y OCREVUS ZUNOVO pueden causar daño hepático. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta cualquier síntoma de daño hepático, como color amarillento de la piel y los ojos (ictericia), náuseas, vómitos, oscurecimiento inusual de la orina y sensación de cansancio o debilidad.
- **Los efectos secundarios más frecuentes de OCREVUS ZUNOVO incluyen:** reacciones a la inyección, infecciones de las vías respiratorias e infecciones cutáneas.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de OCREVUS y OCREVUS ZUNOVO.

Llame a su médico para obtener asesoramiento profesional acerca de los efectos secundarios. Puede notificar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088. También puede notificar los efectos secundarios a Genentech al (888) 835-2555.

Para obtener más información, visite www.OCREVUS.com/es o llame al 1-844-627-3887.

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se ofrece y haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento de OCREVUS](#).

Consulte la Información importante de seguridad adicional que se ofrece y haga clic aquí para obtener la [Información de prescripción](#) completa y la [Guía del medicamento de OCREVUS ZUNOVO](#).

